

## **Terms and Conditions**

The Library provides access to digitized documents strictly for noncommercial educational, research and private purposes and makes no warranty with regard to their use for other purposes. Some of our collections are protected by copyright. Publication and/or broadcast in any form (including electronic) requires prior written permission from the Library.

Each copy of any part of this document must contain there Terms and Conditions. With the usage of the library's online system to access or download a digitized document you accept there Terms and Conditions.

Reproductions of material on the web site may not be made for or donated to other repositories, nor may be further reproduced without written permission from the Library

For reproduction requests and permissions, please contact us. If citing materials, please give proper attribution of the source.

### Imprint:

Director: Mag. Renate Plöchl

Deputy director: Mag. Julian Sagmeister

Owner of medium: Oberösterreichische Landesbibliothek

Publisher: Oberösterreichische Landesbibliothek, 4021 Linz, Schillerplatz 2

### Contact:

Email: [landesbibliothek\(at\)ooe.gv.at](mailto:landesbibliothek(at)ooe.gv.at)

Telephone: +43(732) 7720-53100

allen Wiesen sehr gemein. Juni, Juli, 7. — *Gelblicher H.* . . . . . *A. flavescens.* Gaud.

Blätter in der Jugend gefaltet; untere Blütenspelze 2-spaltig mit spitzen Zipfeln; Fruchtknoten an der Spitze behaart . . . . . 6.

6. Wurzelstock mit kurzen Ausläufern, die unteren Blattscheiden dicht behaart, Blätter oberseits nicht rauh. Rispenäste 1—3, selten mehr Aehrchen, die unteren zu 3—5 in einem Halbquirl, die obersten einzeln; Aehrchen 5—7<sup>'''</sup> lang, grünlich und violett gescheckt, an der Spitze häutig, silberweiss glänzend. — Auf Wiesen, an Wegen, Rainen häufig. Juni, Juli, 7. — *Kurzhaariger H.* . . . . . *A. pubescens.* Huds.

Wurzelstock holzig, Blattscheiden kahl oder nur schwach behaart; Blätter oberseits rauh; Rispe lineal, aufrecht, Rispenäste ein einziges, selten 2 Aehrchen tragend, einzeln, oder höchstens die untersten gepaart. Früchte an der inneren Seite längsfurchig, mit der oberen Blütenspelze verwachsen. — An Waldrändern (Schacher, Grugldorf). Juni, Juli, 7. — *Wiesen-H.* . . . . . *A. pratensis.* L.

15. **Phragmites communis.** Trin. **Gemeines Rohrschilf.** (Tab. I. 38.) An den Teichufern häufig, hie und da auch an der Krems und am Mühlbach bei der Sturmühle bei Hall. August, September, 7.
16. **Dactylis glomerata.** L. **Gemeines Knäuelgras.** (Tab. I. 49.) — Auf Wiesen, an Wegen sehr häufig. Juni, Juli, 7.
17. **Eragrostis praeoides.** Trin. **Schönes Liebesgras.** — (Tab. I. 51.) Die Aehrchen schmutzig-violett oder schwärzlich, denen eines Cyperus ähnlich. — Auf Brachen die *Var. a. minor* mit 1—8<sup>''</sup> langen, rasenförmig im Kreis ausgebreiteten Halmen; Rispenäste nicht halbquirlig (beim Schacher), an Wegen, sandigen Stellen (im Aumayrwörth), August—Oktober. ☉.
18. **Poa.** L. **Rispengras.** (Tab. I. 51.)
1. Aehrchen auf sehr kurzen, dicken Blütenstielchen in einer einfachen Aehre, oder in einer aus einfachen Aehren zusammengesetzten, gedrungenen Rispe, beinahe sitzend, Hüllklappen und Blütenspelzen lederig; Halme 1—6<sup>''</sup> lang, liegend-aufsteigend, starr und kahl.