Die digitale Landesbibliothek Oberösterreich

oö landes bibliothek

Terms and Conditions

The Library provides access to digitized documents strictly for noncommercial educational, research and private purposes and makes no warranty with regard to their use for other purposes. Some of our collections are protected by copyright. Publication and/or broadcast in any form (including electronic) requires prior written permission from the Library.

Each copy of any part of this document must contain there Terms and Conditions. With the usage of the library's online system to access or download a digitized document you accept there Terms and Conditions.

Reproductions of material on the web site may not be made for or donated to other repositories, nor may be further reproduced without written permission from the Library

For reproduction requests and permissions, please contact us. If citing materials, please give proper attribution of the source.

Imprint:
Director: Mag. Renate Plöchl
Deputy director: Mag. Julian Sagmeister
Owner of medium: Oberösterreichische Landesbibliothek
Publisher: Oberösterreichische Landesbibliothek, 4021 Linz, Schillerplatz 2

Contact:
Email: landesbibliothek(at)ooe.gv.at
Telephone: +43(732) 7720-53100

Tabelle III.

I. Beispiele von zumeist erprobten Samenmischungen für verschiedene Bodenarten und Nutzungszwecke (pro Hektar).

Nr.	Samenart	Auf frischem, mildem Lehmboden								Auf nassem, schwerem Lehm- oder Thonboden								Auf Moorboden (cultivirtem Niederungs- od. Wiesenmoor[6])								Auf Sandboden								Nr.
		I. Kleegras[1]) incl. 30% Zuschlag		II. Wechselwiese[4]) (Eggartwiese) für Niederung incl. 50% Zuschlag		III. Dauerwiese[5]) incl. 70% Zuschlag		IV. Dauerweide incl. 100% Zuschlag		V. Kleegras incl. 30% Zuschlag		VI. Wechselwiese incl. 60% Zuschlag		VII. Dauerwiese incl. 70% Zuschlag		VIII. Dauerweide incl. 100% Zuschlag		IX. Kleegras incl. 30% Zuschlag		X. Wechselwiese incl. 50% Zuschlag		XI. Dauerwiese incl. 70% Zuschlag		XII. Dauerweide incl. 90% Zuschlag		XIII. Kleegras incl. 20% Zuschlag		XIV. Wechselwiese incl. 50% Zuschlag		XV. Dauerwiese incl. 100% Zuschlag		XVI. Dauerweide incl. 100% Zuschlag (bei Schafgarbe nur 50%)		
		Fl. %[2])	Kilo %[3])	Fl. %	Kilo %	Fl. %	Kilo %	Fl. %	Kilo %	Fl. %	Kilo %	Fl. %	Kilo %	Fl. %	Kilo %	Fl. %	Kilo %	Fl. %	Kilo %	Fl. %	Kilo %	Fl. %	Kilo %	Fl. %	Kilo %	Fl. %	Kilo %	Fl. %	Kilo %	Fl. %	Kilo %	Fl. %	Kilo %	
1	Rothklee	60	1373[7])	15	396	10	299	..	..	15	343	10	282	5	150	5	176	35	801	10	264	5	150	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1
2	Weissklee	..	..	2	26	2	29	10	173	..	..	..	..	2	29	..	..	..	..	..	..	..	..	10	164	30	311	..	..	..	..	..	..	2
3	Bastardklee	20	265	15	230	3	52	5	102	55	729	23	375	13	225	15	306	35	464	23	352	5	87	5	97	10	122	5	77	5	102	..	..	3
4	Schotenklee	..	..	..	..	5	73	5	86	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	10	146	5	82	..	..	10	129	10	172	20	344	4
5	Wundklee	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	5	128	..	..	..	..	5
6	Hopfenklee	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	30	612	10	256	5	170	..	..	6
7	Timothe	10	204	18	423	8	213	10	313	15	305	15	376	5	133	5	157	10	204	15	352	10	266	10	298	5	94	10	235	10	313	..	..	7
8	Wiesenrispengras	..	..	..	..	10	150	10	176	..	..	..	141	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	15	264	20	352	8
9	Gemeines Rispengras	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	5	84	5	99	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	9
10	Kammgras	..	..	..	..	5	138	20	648	..	..	..	..	5	138	20	648	..	..	..	..	..	..	15	462	..	..	..	..	..	..	..	..	10
11	Fioringras	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	10	132	5	73	10	173	..	..	..	..	..	..	5	82	..	..	..	..	..	..	..	..	11
12	Rohrglanzgras	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	5	116	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	12
13	Raygras, englisch	..	..	10	639	..	..	15	1278	15	831	15	1023	10	724	10	852	5	277	10	639	..	..	5	405	20	1022	..	..	..	..	..	..	13
14	„ italienisch	10	436	5	251	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	15	653	..	..	..	..	..	..	5	201	10	503	..	..	..	..	14
15	„ französisch	..	..	15	828	10	626	..	..	..	..	10	589	5	313	..	..	..	..	12	662	5	367	..	..	..	..	10	552	5	368	..	..	15
16	Wiesenschwingel	..	..	10	648	5	367	10	864	..	..	7	484	10	734	10	864	..	..	10	648	10	734	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	16
17	Schafschwingel	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	5	144	17
18	Härtlicher Schafschwingel	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	5	142	18
19	Rother Schwingel	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	10	253	10	283	..	..	10	223	..	..	5	149	19
20	Rohrschwingel	..	..	..	..	5	308	..	..	..	..	..	..	10	615	..	..	..	..	..	..	10	615	5	344	..	..	..	..	5	362	5	362	20
21	Knaulgras	..	..	10	334	15	563	10	445	..	..	10	356	15	563	10	445	..	..	10	334	10	378	10	423	..	..	..	..	10	445	10	445	21
22	Wiesenfuchsschwanz	..	..	..	..	10	110	..	..	..	..	..	..	10	110	10	130	..	..	10	97	10	110	10	123	..	..	..	..	..	..	..	..	22
23	Wolliges Honiggras	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3	60	..	..	23
24	Goldhafer, echt	..	..	..	..	10	90	5	53	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	10	90	10	100	..	..	10	79	10	106	..	..	24
25	Ruchgras, echt	..	..	..	..	2	30	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	35	5	88	25
26	Aufrechte Trespe	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	10	614	26
27	Wehrlose Trespe	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	20	1215	20	1620	10	810	27
28	Schafgarbe	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	5	53	28

[1]) Der Ausdauer nach sind: Kleegras 2- bis 3jährig; Wechselwiese 4- bis 6jährig; Dauerwiese und Dauerweide mindestens 10jährig.

[2]) Diese Rubrik enthält jedesmal die Flächenprocente (Procente der Reinsaat, siehe Seite 12).

[3]) In dieser Rubrik sind die jeweiligen Kiloprocente pro Hektar (siehe Erläuterungen Seite 12) mit Zugrundelegung des in der Aussaattabelle angegebenen durchschnittlichen Gebrauchswerthes der Samen angegeben.

[4]) In höheren und rauheren Lagen lässt man die Raygräser weg und berücksichtigt dafür mehr die übrigen Arten, insbesondere Wiesenschwingel, Timothe und Knaulgras; bei Dauerwiesen können auch Rohrschwingel und Rohrglanzgras, insbesondere für Alpenwiesen verwendet werden. Diese Mischungen sind zur Ansaat auf den Eggärten in jenen Gebirgsgegenden, wo diese Art des Futterbaues und zwar nur mit natürlicher Berasung, wie fast durchwegs in unseren Alpenländern, mit Vortheil zu verwenden und wurden über meine Veranlassung bereits an vielen Orten im Lande Salzburg, Oberösterreich, Steiermark, Böhmerwalde etc. mit Erfolg versuchsweise angebaut.

[5]) Bei Anlage von speciellen Wässerwiesen oder bei bewässerbaren Grundstücken ist in der Mischung hauptsächlich der Wiesenfuchsschwanz zu bevorzugen (bis zu 25 und 30 Proc. der Reinsaat).

[6]) Auch auf unabgetorftem Hochmoor können Grassamenmischungen, nach unseren Erfahrungen bei den Versuchen auf den galizischen Moorculturstationen, mit Erfolg angebaut werden; freilich muss man hier mit minderwerthigen Futtergräsern vorlieb nehmen, wie z. B. Honiggras und Rohrglanzgras; aber in richtigem Gemenge mit diesen gedeihen merkwürdigerweise auch bessere Gräser, wie Timothe, Wiesenrispe, spätes Rispengras (Poa serotina), rother Schwingel (besonders die grossblüthige Form). Von Kleearten kommt hier in erster Linie Schotenklee und Bastardklee in Betracht.

[7]) Die Anbaumenge in Kilo wird gefunden, wenn man die Kiloprocente durch den jeweiligen Gebrauchswerth der Samen dividirt. (Vergleiche auch Beispiel auf Seite 13.)