Die digitale Landesbibliothek Oberösterreich

oö landes bibliothek

Terms and Conditions

The Library provides access to digitized documents strictly for noncommercial educational, research and private purposes and makes no warranty with regard to their use for other purposes. Some of our collections are protected by copyright. Publication and/or broadcast in any form (including electronic) requires prior written permission from the Library.

Each copy of any part of this document must contain there Terms and Conditions. With the usage of the library's online system to access or download a digitized document you accept there Terms and Conditions.

Reproductions of material on the web site may not be made for or donated to other repositories, nor may be further reproduced without written permission from the Library

For reproduction requests and permissions, please contact us. If citing materials, please give proper attribution of the source.

Imprint:
Director: Mag. Renate Plöchl
Deputy director: Mag. Julian Sagmeister
Owner of medium: Oberösterreichische Landesbibliothek
Publisher: Oberösterreichische Landesbibliothek, 4021 Linz, Schillerplatz 2

Contact:
Email: landesbibliothek(at)ooe.gv.at
Telephone: +43(732) 7720-53100

Stärke der Stöcke zur Schwarmzeit. Blüten- und Honigbedarf zum Wachsbau.

Ein starker Stock enthält zur Schwarmzeit	Zu 1 *kg* Wachs brauchen die		Das specifische Gewicht ist von
	Bienen	*kg*	
1 Königin 2000—5000 Drohnen 30.000—60.000 Arbeiter 60.000—70.000 brutbesetzte Zellen 1—15 königliche Nymphen	Honig . . . Blütenstaub	10 1	Honig 1·39—1·43 Wachs 0·92—0·93

Zellenmenge. Temperatureinfluß auf Wachs und Bienen.

Auf 1 dm^2 befinden sich an beiden Seiten der Wabe	Wachs wird geschmeidig bei	Wachs schmilzt bei	Temperatur im Bienenklumpen	Die Biene erstarrt bei	Die Biene hört auf zu arbeiten bei	Die Biene fliegt am fleißigst. bei
850 Arbeiterzellen 510 Drohnenzellen	30° C.	63° C.	Im Winter 20—22° C. Im Sommer 25—35° C.	+7-10° C.	+ 37° C.	+22-25° C.

Schonzeiten des Wildes und der Fische.

▨ Schonzeit.

Wild- oder Fischart	Jänner	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Sept.	October	Nov.	Decemb.
Auer- und Birkhahn	▨	▨				▨	▨	▨	▨	▨	▨	▨
Auer- und Birkhennen	▨	▨	▨	▨	▨	▨	▨	▨	▨	▨	▨	▨
Biber		▨	▨	▨	▨	▨	▨	▨	▨			
Männliches Roth- und Damwild	▨	▨	▨	▨	▨	▨					▨	▨
Weibliches Roth- u. Damwild, Kitzböcke		▨	▨	▨	▨	▨	▨	▨	▨			
Fasanen, Rebhühner		▨	▨	▨	▨	▨	▨					
Gemsböcke	▨	▨	▨	▨	▨	▨	▨ b.15.					▨
Gemsgeiße		▨	▨	▨	▨	▨	▨	▨	▨			
Hasel-, Stein- und Schneehühner, Schnepfen			▨	▨	▨	▨	▨	▨ b.15.				
Rehböcke			▨	▨	▨							
Rehgeiße	▨	▨	▨	▨	▨	▨	▨	▨	▨	▨	▨	▨
Wildgänse, Wildenten			▨	▨	▨							
Wachtel, Wildtauben		▨	▨	▨	▨	▨	▨					
Hasen	▨ v.15.	▨	▨	▨	▨	▨	▨	▨ b.15.				
Forellen										▨ v.15.	▨	▨ b.15.
Aschen, Bärschlinge, Huchen			▨ v.15.	▨ b.15.								
Saiblinge										▨ v.15.	▨ b.15.	
Karpfen					▨	▨						
Näslinge				▨								
Brachsen, Barben, Schieden und alle Weißfischarten, Hechte					▨							
Schille				▨	▨							
Bodenrenken, Riedlinge, Kröpflinge, Rheinanken											▨	
Lachsen, Seeforellen, Lachsforellen											▨	
Rutten	▨											
Welse, Scheiden, Waller, Schleien						▨						
Krebse	▨	▨	▨									▨