

Terms and Conditions

The Library provides access to digitized documents strictly for noncommercial educational, research and private purposes and makes no warranty with regard to their use for other purposes. Some of our collections are protected by copyright. Publication and/or broadcast in any form (including electronic) requires prior written permission from the Library.

Each copy of any part of this document must contain there Terms and Conditions. With the usage of the library's online system to access or download a digitized document you accept there Terms and Conditions.

Reproductions of material on the web site may not be made for or donated to other repositories, nor may be further reproduced without written permission from the Library

For reproduction requests and permissions, please contact us. If citing materials, please give proper attribution of the source.

Imprint:

Director: Mag. Renate Plöchl

Deputy director: Mag. Julian Sagmeister

Owner of medium: Oberösterreichische Landesbibliothek

Publisher: Oberösterreichische Landesbibliothek, 4021 Linz, Schillerplatz 2

Contact:

Email: [landesbibliothek\(at\)ooe.gv.at](mailto:landesbibliothek(at)ooe.gv.at)

Telephone: +43(732) 7720-53100

Nr.	Bezeichnung der Sorten	Ausfaat		Eie- oder Pflanzweite	Bemerkungen
		Zeit	Quantum		
1	Spinat, langblättriger scharfsamiger	vom vorigen Herbst	Siehe unten	Siehe unten	Ende April streue man zwischen die Reihe 20 Gramm Chlorsalpeter auf 1 Quadratmeter
2	Apunzel, holländische breitblättrige	Anfang März $\frac{1}{2}$ Kilogramm		in Kisten 50 Centimeter Entfernung, also 3 Kisten auf's Beet. Kisten 5 Centimeter tief	
3	Kopfsalat, brauner Winter	Ende März $\frac{1}{2}$ "		in Kisten v. 25 Ctm. Abstand	im Zimm. od. Mistbeetauszufäen vorgekeimte Kartoffeln legen
4	Kneifelerbsen „Saractacus“	Mitte April $\frac{1}{2}$ "		„Queen“ breitw. dicht säen	
5	Kneifelerbsen, frühe niedrige volltragende	Ende März $\frac{1}{3}$ "		breitwürfelig säen	unterhacken, dann Flachhacken und nachdem festtreten mit Treibrettern
6	Kneifelerbsen, großschotige Schnabel-	Ende März $\frac{1}{3}$ "		breitwürfelig säen	
7	Spinat, großer rundblättriger.	Ende Februar je 2 Gramm		3 bis 4 Bohnen 5 Centimeter tief legen und festdrücken.	Reinig 15 Centimeter weit je 2 Korn
8	Spinat, großer rundblättriger.	Anfang April 700 Knollen		Bei Stangenbohnen 8 Bohnen legen	
9	Kopfsalat, gelb. „Trogkopf“ und Kohlrabi, w. Wiener-	Ende März 60 "			
10-17	Krebstastoffeln „Pefe von Erfurt“	Anfang April 700 Knollen			
18	Zwiebeln, $\frac{1}{2}$ Beet „Queen“, beste Sorte zum Einmachen, $\frac{1}{2}$ Beet Streckzwiebeln	Ende März 60 "			
19	Zwiebeln, Zitruer Kieien-	Anfang April je 15 "			
20	Möhren, $\frac{1}{2}$ Beet „Dunwider“, $\frac{1}{2}$ Beet „Nantaise“	Ende März je 15 "			
21	Möhren, Draumschweiger lange rote	Ende März je 30 "			
22	Radies und Mairettig je $\frac{1}{4}$ Beet, Sommerrettig $\frac{1}{2}$ Beet	Anfang April je 15 "			
23	Buschbohnen, $\frac{1}{2}$ Beet allerle. garischot.	Anfang Mai je $\frac{1}{4}$ Kilogr.			
24	Brech, $\frac{1}{2}$ Beet „Kaiser Wilhelm“				
25	Buschbohnen, $\frac{1}{2}$ Beet weiße „Hinrichs Kieien“, $\frac{1}{2}$ Beet weiße „Flageolet Wachs“				
26	Stangenbohnen, $\frac{1}{2}$ Beet „Zehn Wochen“, $\frac{1}{2}$ Beet rheinische Sped, Stangenbohnen, $\frac{1}{2}$ Beet „Schlachtschw.“, $\frac{1}{2}$ Beet Wachs „Mont d'or“				

27	Sellerie, Erfurter Markt-	Anfang März in Topfe oder Mistbeete	2 Gramm	Pflanzweite 40 Centimeter	3 Wochen nach Ausgung müssen die Pflanzen verstopft werden
28	Porree, Erfurter dicker Winter-	Mitte März $\frac{1}{2}$ Kilogramm	5 "	25 "	
29	Puffbohnen, Erfurter	Anfang April $\frac{1}{2}$ "	5 Gramm	je 50 Centimeter 3 bis 4 Bohnen 8 Centimeter tief auf jedes Beet in der Mitte in einer Reihe je 25 Centimeter 8 bis 10 Korn 3 bis 4 Centimeter tief legen	Links und rechts von den Gurken können Kohlrabi und Salat ihren Platz finden. Kohlrabi und Salat für diesen Zweck werden Anfang April, 2,5 Gramm auf's Saatbeet, im Freien ausgefät
30	Gurken, lange grüne volltragende	Anfang Mai	5 "		
31	" " " "	Anfang Mai	5 "		
32	" " " "	Anfang Mai	5 "		
33	" " extra lange grüne Schlangen-	Anfang April	30 Gramm Sa-latr-50 Gramm Schwarzwurz.	in Kisten von 25 Centimeter Entfernung	Spät. einz. fressen auf 20 Centim. " " " " 10 "
34	$\frac{1}{2}$ Beet Salatrüben, köhner birnförmige, $\frac{1}{2}$ Beet Schwarzwurzel	Anf. März in Zimmer in Kästchen oder Topfe oder in Mistbeete	2 Gramm	Mitte April 50 x 50 Centimeter weit pflanzen	
35	Blumentohl, Erfurter Zwerg-	Ende April	5 Gramm	Anfang Juni 50 x 50 Ctm.	1 Quadratmeter Ausfaatfläche genügt für 2 Beete zu pflanzen, der beste Platz dafür ist im Halbschatten vor den Himbeeren
36	Weißkraut, Erfurter kleines frühes	Anfang Mai	5 "	Ende Juni, Pflanzweite 50 x 50 Centimeter	
37	Rothkraut, Erfurter Zwerg-	Anfang Mai	5 "	35 bis 40 Centimeter	
38	Wirsing „Eisentopf“, frühestes	Anfang Juni	3 "	25 Centimeter	
1 u. 2	Nachdem die Beete von 1 bis 13 abgeräumt sind, werden sie gedüngt und nochmals bepflanzt für den Herbst- und Winterbedarf wie folgt:	Anfang Juni	30 "	Korn in die Erde drücken	
3 u. 4	Rosenkohl, Erfurter halbhohler				
5 u. 6	Blätterkohl, Dreienbrunnen- säuber				
7 u. 8	Wirsing, Ulmer oder Erfurter				
9	Rothkraut, Erfurter				
10	Blumentohl, Erfurter Zwerg-				
11	Kohlrüben, gelbe Schmalz-				
12	Endivien				
13	Winterrettig				