

## **Terms and Conditions**

The Library provides access to digitized documents strictly for noncommercial educational, research and private purposes and makes no warranty with regard to their use for other purposes. Some of our collections are protected by copyright. Publication and/or broadcast in any form (including electronic) requires prior written permission from the Library.

Each copy of any part of this document must contain there Terms and Conditions. With the usage of the library's online system to access or download a digitized document you accept there Terms and Conditions.

Reproductions of material on the web site may not be made for or donated to other repositories, nor may be further reproduced without written permission from the Library

For reproduction requests and permissions, please contact us. If citing materials, please give proper attribution of the source.

### Imprint:

Director: Mag. Renate Plöchl

Deputy director: Mag. Julian Sagmeister

Owner of medium: Oberösterreichische Landesbibliothek

Publisher: Oberösterreichische Landesbibliothek, 4021 Linz, Schillerplatz 2

### Contact:

Email: [landesbibliothek\(at\)ooe.gv.at](mailto:landesbibliothek(at)ooe.gv.at)

Telephone: +43(732) 7720-53100

**Brünstigkeit.**

Thiergattung	Dauer der Brünstigkeit	Wiedertekehr der Brünstigkeit		
		bei Nichtbefruchtung		nach dem Gebären
Pferd . . . . .	24—36 Stdn.	nach	8—10 Tagen	nach 9—14 Tagen
Kuh . . . . .	24—36 "	"	21—28 "	" 28—42 "
Schaf . . . . .	24—36 "	"	14—21 "	" 22—185 "*)
Schwein . . . . .	30—40 "	"	21—28 "	" 42—56 "

\*) Der letzte Termin bezeichnet den Zeitraum, welchen man zwischen dem Lammen und der Deckzeit gewöhnlich verstreichen läßt.

**Zähneausbruch und -Wechsel bei Pferd, Rind, Schaf.**

Thierart und Lebensalter	Schneidezähne				Backenzähne beim Heugriß	Backenzähne					
	1.	2.	3.	4.		Vorbackenzähne			Sinterbackenzähne		
						3.	2.	1.	1.	2.	3.
<b>1. Pferd Ausbruch:</b>											
Bei Geburt . . . . .	4	—	—	—	—	4	4	4	—	—	—
4—6 Wochen . . . . .	4	4	—	—	—	4	4	4	—	—	—
6—9 Monate . . . . .	4	4	—	4	—	4	4	4	(4)	—	—
<b>Wechsel:</b>											
2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> —3 Jahre . . . . .	(4)	4	—	4	—	(4)	(4)	4	4	(4)	—
3 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> —4 " . . . . .	4	(4)	—	4	—	4	4	(4)	4	4	—
4 " . . . . .	4	4	—	4	(4)	4	4	4	4	4	(4)
4 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> —5 " . . . . .	4	4	—	(4)	4	4	4	4	4	4	4
5 " . . . . .	4	4	—	4	4	4	4	4	4	4	4
<b>2. Rind und Schaf Ausbruch:</b>											
Bei Geburt . . . . .	2	—	—	—	4	4	—	4	—	—	—
1. Woche . . . . .	2	2	—	—	4	4	—	4	—	—	—
2. bis 3. Woche . . . . .	2	2	2	2	4	4	2	4	—	—	—
<b>Wechsel:</b>											
1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> —3 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> Jahr . . . . .	2	2	2	2	—	4	4	4	4	—	—
1 —1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> Jahre . . . . .	2	2	2	2	—	4	4	4	4	4	—
2 —2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " . . . . .	2	2	2	2	—	4	4	4	4	4	4
2 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> —3 " . . . . .	2	2	2	2	—	4	4	4	4	4	4
3 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> —4 " . . . . .	2	2	2	2	—	4	4	4	4	4	4

NB. Die einfachen Ziffern bedeuten die Milchzähne, die fetten die Ersatzzähne, die eingeklammerten, daß diese Zähne gleich als bleibende Zähne erscheinen oder nach dem Ausbrechen der Milchzähne gegen die bleibenden Zähne gewechselt werden.

**Altersbeurtheilung des Pferdes.**

Die Reibefläche der Schneidezähne hat ovale Form mit . . . . . 6—14 Jahren  
 " Zangenfunden verschwinden im Unterkiefer mit . . . . . 6 "  
 " Mittelzähnefunden " " " " . . . . . 7 "  
 " Eckzähnefunden " " " " . . . . . 8 "  
 Der Eckzähne-Einbiß entsteht mit . . . . . 9 "  
 verschwindet mit . . . . . 10 "  
 Die Reibefläche der Schneidezähne hat runde Form mit . . . 12—20 "  
 " " " dreieckige " " . . . 18—26 "  
 " " " verkehrtovale " " . . . 24 "  
 Im Oberkiefer verschwinden die Kunden um 3 Jahre später, die Reibeflächen ändern sich daher auch um 3 Jahre später.